

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO INTRADÉRMICA

Definição: Consiste na aplicação de medicamentos na derme.

Indicações:

- Teste de hipersensibilidade e alergias;
- Imunização;
- teste tuberculínico ou PPD (Purified Protein Derivative);
- Administração de anestésicos locais.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1. Realizar a higienização das mãos.
2. Avaliar o paciente.
3. Preparar a medicação.
4. Conferir os treze certos da administração de medicamento.
5. Comunicar o início do procedimento.
6. Proteger unidade com biombo, se necessário.
7. Escolher melhor local: face interna do antebraço e parte superior dorsal da região escapular (livre de pelos ou lesões).
8. Posicionar o paciente de acordo com a área selecionada: o paciente deve estar sentado, antebraço descoberto, apoiado sobre uma superfície plana.
9. Calçar luvas de procedimento e colocar os outros EPIs.
10. Realizar a higiene do local escolhido com água e sabão, se houver sujidade aparente.
11. Remover a capa protetora da agulha.
12. Tracionar a pele para baixo com a mão não dominante.
13. Introduzir a agulha, com bisel voltado para cima em ângulo de 15º, avance apenas o bisel da agulha abaixo da epiderme.
14. Soltar a pele que está tracionada.
15. Devagar, injetar toda a solução, observando a formação da bolha na pele.
16. Retirar a agulha no mesmo ângulo de introdução sem pressionar o local. Se necessário secar levemente a área com algodão.
17. Depositar a seringa sem reencapar no canto da bandeja ou então acionar dispositivos especiais de segurança que protegem a agulha.
18. Reposicionar o paciente.
19. Recompôr a unidade.
20. Reunir material.
21. Desprezar seringa e agulha no recipiente próprio para perfuro cortante.
22. Retirar luvas de procedimento e demais EPIs.
23. Higienizar as mãos.

24. Observar a pele quanto à hiperemia ou edema; se este é um teste de alergia, observar para reações sistêmicas (ex. dificuldade respiratória, suor, fraqueza, diminuição da pressão sanguínea, náusea, vômito, cianose).

25. Proceder à anotação do procedimento e dos resultados no prontuário e checar a administração do medicamento na prescrição médica.

Consideração:

- Volume máximo: 0,5ml.

REFERÊNCIAS:

BARROS, A. L. B. L.; LOPES, J. L.; MORAIS, S. C. R. V. **Procedimentos de enfermagem para a prática clínica**. Porto Alegre: Artmed, 2019. 482 p.

CABRAL, I. E. **Administração de medicamentos** – Enfermagem prática. Rio de Janeiro. Reichmann & Affonso Editores, 2002.